

---

# International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances (INN)

---

## RECOMMENDED International Nonproprietary Names: List 51

Notice is hereby given that, in accordance with paragraph 7 of the Procedure for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances [*Off. Rec. Wld Health Org.*, 1955, **60**, 3 (Resolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolution EB43.R9)], the following names are selected as Recommended International Nonproprietary Names. The inclusion of a name in the lists of Recommended International Nonproprietary Names does not imply any recommendation of the use of the substance in medicine or pharmacy. Lists of Proposed (1–85) and Recommended (1–45) International Nonproprietary Names can be found in *Cumulative List No. 10, 2002* (available in CD-ROM only).

## Dénominations communes internationales des Substances pharmaceutiques (DCI)

## Dénominations communes internationales RECOMMANDÉES: Liste 51

Il est notifié que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la Procédure à suivre en vue du choix de Dénominations communes internationales recommandées pour les Substances pharmaceutiques [*Actes off. Org. mond. Santé*, 1955, **60**, 3 (résolution EB15.R7); 1969, **173**, 10 (résolution EB43.R9)] les dénominations ci-dessous sont choisies par l'Organisation mondiale de la Santé en tant que dénominations communes internationales recommandées. L'inclusion d'une dénomination dans les listes de DCI recommandées n'implique aucune recommandation en vue de l'utilisation de la substance correspondante en médecine ou en pharmacie. On trouvera d'autres listes de Dénominations communes internationales proposées (1–85) et recommandées (1–45) dans la *Liste récapitulative No. 10, 2002* (disponible sur CD-ROM seulement).

## Denominaciones Comunes Internacionales para las Sustancias Farmacéuticas (DCI)

## Denominaciones Comunes Internacionales RECOMENDADAS: Lista 51

De conformidad con lo que dispone el párrafo 7 del Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas [*Act. Of. Mund. Salud*, 1955, **60**, 3 (Resolución EB15.R7); 1969, **173**, 10 (Resolución EB43.R9)], se comunica por el presente anuncio que las denominaciones que a continuación se expresan han sido seleccionadas como Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas. La inclusión de una denominación en las listas de las Denominaciones Comunes Recomendadas no supone recomendación alguna en favor del empleo de la sustancia respectiva en medicina o en farmacia. Las listas de Denominaciones Comunes Internacionales Propuestas (1–85) y Recomendadas (1–45) se encuentran reunidas en *Cumulative List No. 10, 2002* (disponible sólo en CD-ROM).

<b>Latin</b> , English, French, Spanish:	
<i>Recommended INN</i>	<i>Chemical name or description; Molecular formula; Graphic formula</i>
<i>DCI Recommandée</i>	<i>Nom chimique ou description; Formule brute; Formule développée</i>
<i>DCI Recomendada</i>	<i>Nombre químico o descripción; Fórmula empírica; Fórmula desarrollada</i>

**adargileukinum alfa**  
adargileukin alfa

[88-arginine]interleukin 2 (human clone pTIL2-21a) (partly glycosylated)

## adargileukine alfa

[88-arginine]interleukine 2 humaine (clone pTIL2-21a) (en partie glycosylée)

## adargileukina alfa

[88-arginina]interleukina 2 humana (clon pTIL2-21a) (parcialmente glicosilada)

 $C_{695}H_{1124}N_{180}O_{202}S_7$  (peptide)


APTSSSSTKKKT	QLQLEHLLLD	LQMILNGINN	YKNPKL/TRML
TFKFYMPKKA	TELKHLQCLE	EELKPLEEVVL	NLAQSKNFHL
RPRDLISRIN	VIVLELKGSE	TTFMCEYADE	TATIVEFLNR
WITFCQSIIS	TLT		

**alamifovirum**  
alamifovirbis(2,2,2-trifluoroethyl) [(2-{2-amino-6-[[(4-methoxyphenyl)sulfanyl]-9*H*-purin-9-yl]ethoxy)methyl]phosphonate

## alamifovir

[[2-[2-amino-6-[(4-méthoxyphényl)sulfanyl]-9*H*-purin-9-yl]éthoxy]méthyl]phosphonate de bis(2,2,2-trifluoroéthyle)

## alamifovir

[(2-{2-amino-6-[[(4-metoxifenil)sulfanil]-9*H*-purin-9-il]etoxi)métil]fosfonato de bis(2,2,2-trifluoroetilo) $C_{19}H_{20}F_6N_6O_5PS$ 

**aprinocarsenum**  
aprinocarsen

2'-deoxy-*P*-thioguanyl-*I*(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-*I*(3'→5')-  
*P*-thiothymidylyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thiocytidyl-*I*(3'→5')-  
*P*-thiothymidylyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thiocytidyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-  
*P*-thioguanyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-  
*P*-thioguanyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioguanyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-  
*P*-thioguanyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thioadenyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-  
*P*-thioguanyl-*I*(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-*I*(3'→5')-*P*-thiothymidylyl-*I*(3'→5')-  
*P*-thiothymidylyl-*I*(3'→5')-2'-deoxy-*P*-thiocytidyl-*I*(3'→5')-2'-deoxyadenosine

## aprinocarsen

2'-désoxy-*P*-thioadénylyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thiocytidyl-*I*(5'→3')-  
*P*-thiothymidylyl-*I*(5'→3')-*P*-thiothymidylyl-*I*(5'→3')-*P*-thiothymidylyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-*P*-thiothymidylyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-*P*-thiothymidylyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-2'-désoxy-*P*-thioguanyl-*I*(5'→3')-2'-désoxyguanosine

## aprinocarseno

2'-desoxi-*P*-tioadenilil-(5'→3')-2'-desoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-  
*P*-tiotimidilil-(5'→3')-*P*-tiotimidilil-(5'→3')-*P*-tiotimidilil-(5'→3')-  
2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(5'→3')-2'-desoxi-*P*-tioadenilil-(5'→3')-  
2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(5'→3')-*P*-tiotimidilil-(5'→3')-2'-desoxi-  
*P*-tioguanilil-(5'→3')-2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(5'→3')-*P*-tiotimidilil-(5'→3')-  
(5'→3')-2'-desoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-2'-desoxi-*P*-tioguanilil-(5'→3')-  
2'-desoxi-*P*-tiocitidilil-(5'→3')-*P*-tiotimidilil-(5'→3')-2'-desoxi-  
*P*-tiocitidilil-(5'→3')-*P*-tiotimidilil-(5'→3')-*P*-tiotimidilil-(5'→3')-  
2'-desoxiguanosina

C<sub>196</sub>H<sub>249</sub>N<sub>68</sub>O<sub>105</sub>P<sub>19</sub>S<sub>19</sub>

**belimumabum**  
belimumab

immunoglobulin G1, anti-(human cytokine BAFF) (human monoclonal LymphoStat-B heavy chain), disulfide with human monoclonal LymphoStat-B λ-chain, dimer

## bélimumab

immunoglobuline G1, anti-(cytokine BAFF humaine) ; dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne λ de l'anticorps monoclonal humain LymphoStat-B

## belimumab

immunoglobulina G1, anti-(citoquina BAFF humana) ; dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena λ del anticuerpo monoclonal humano LymphoStat-B

**cantuzumab mertansinum**  
cantuzumab mertansine


immunoglobulin G1, anti-(mucin CanAg) (human-mouse monoclonal C242 heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal C242 light chain, dimer, conjugate at the 6-amino groups of four lysine residues forming an amide bond with (4RS)-4-[3-[(1S)-2-{{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloro-21-hydroxy-12,20-dimethoxy-2,5,9,16-tetramethyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatetracyclo[19.3.1.1<sup>10,14</sup>.0<sup>3,5</sup>]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-yl]oxy}-1-methyl-2-oxoethyl]=methylamino]-3-oxopropyl]disulfanyl]pentanoyl groups

## cantuzumab mertansine

immunoglobuline G1, anti-(mucin CanAg) ; dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris C242 humanisé dont les groupes 6-amino de quatre lysines sont amidifiés par l'acide (4RS)-4-[3-[(1S)-2-{{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-chloro-21-hydroxy-12,20-diméthoxy-2,5,9,16-tétraméthyl-8,23-dioxo-4,24-dioxa-9,22-diazatétracyclo[19.3.1.1<sup>10,14</sup>.0<sup>3,5</sup>]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaén-6-yl]oxy}-1-méthyl-2-oxoéthyl]=méthylamino]-3-oxopropyl]disulfanyl]pentanoïque

## cantuzumab mertansina

inmunoglobulina G1, anti-(mucina CanAg) ; dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena ligera del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón C242 en el que los grupos 6-amino de cuatro lisinas están amidificados por ácido (4RS)-4-[3-[(1S)-2-{{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-cloro-21-hidroxi-2,5,9,16-tetrametil-12,20-dimetoxi-4,24-dioxa-8,23-dioxo-9,22-diazatetraciclo[19.3.1.1<sup>10,14</sup>.0<sup>3,5</sup>]hexacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-yl]oxi}-1-metil-2-oxoetil]metilamino]-3-oxopropil]disulfanil]pentanoico



cantuzumab = Ig(NH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>

**cimicoxibum**  
cimicoxib


4-[4-chloro-5-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-1*H*-imidazol-1-yl]benzenesulfonamide

## cimicoxib

4-[4-chloro-5-(3-fluoro-4-méthoxyphényl)-1*H*-imidazol-1-yl]benzènesulfonamide

## cimicoxib

4-[4-cloro-5-(3-fluoro-4-metoxifenil)-1*H*-imidazol-1-il]bencenosulfonamida

**dabuzalgronum**

dabuzalgron


*N*-{6-chloro-3-[(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)methoxy]-2-methylphenyl}methanesulfonamide

dabuzalgron

*N*-[6-chloro-3-[(4,5-dihydro-1*H*-imidazol-2-yl)méthoxy]-2-méthylphényle]méthanesulfonamide

dabuzalgrón

*N*-{6-cloro-3-[(4,5-dihidro-1*H*-imidazol-2-il)metoxi]-2-metilfenil}metanosulfonamida

**dacinostatum**

dacinostat



(2*E*)-*N*-hydroxy-3-[4-((2-hydroxyethyl)[2-(1*H*-indol-3-yl)ethyl]amino)methyl]phenyl]propenamide

dacinostat

(2*E*)-*N*-hydroxy-3-[4-[(2-hydroxyéthyl)[2-(1*H*-indol-3-yl)éthyl]amino]méthyl]phényle]prop-2-énamide

dacinostat

(2*E*)-*N*-hidroxi-3-[4-((2-hidroxietil)[2-(1*H*-indol-3-il)etil]amino)metil]fenil]propenamida



**dalbavancinum**  
dalbavancin



5,31-dichloro-38-de(methoxycarbonyl)-7-demethyl-19-deoxy-56-O-[2-deoxy-2-[(10-methylundecanoyl)amino]- $\beta$ -D-glucopyranuronosyl]-38-[[3-(dimethylamino)propyl]carbamoyl]-42-O- $\alpha$ -D-mannopyranosyl-15-Nmethyl(ristomycin A aglycone) (main component)

## dalbavancine

acide 2-désoxy-1-O-[(3S,15R,18R,34R,35S,38S,48R,50aR)-5,31-dichloro-38-[[3-(diméthylamino)propyl]carbamoyl]-6,11,34,40,44-pentahydroxy-42-( $\alpha$ -D-mannopyranosyloxy)-15-(méthylamino)-2,16,36,50,51,59-hexaoxo-2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a-tétradécahydro-20,23:30,33-diéthéno-3,18:35,48-bis(iminométhano)-1H,15H-4:8:10,14:25,28:43,47-tétraméthénano-34H-[1,14,6,22]dioxadiazacyclooctacosino[4,5-m][10,2,16]=benzoxadiazacyclotetracosén-56-yl]-2-[(10-méthylundécanol)amino]- $\beta$ -D-glucopyranuronique (composant majeur)

## dalbavancina

ácido 1-O-[(3S,15R,18R,34R,35S,38S,48R,50aR)-5,31-dicloro-38-[[3-(dimetilamino)propil]carbamoil]-6,11,34,40,44-pentahidroxi-42-( $\alpha$ -D-manopiranosiloxy)-15-(metilamino)-2,16,36,50,51,59-hexaoxo-2,3,16,17,18,19,35,36,37,38,48,49,50,50a-tetradecahidro-20,23:30,33-dieteno-3,18:35,48-bis(iminometano)-1H,15H-4,8:10,14:25,28:43,47-tetrameteno-34H-[1,14,6,22]dioxadiazaciclooctacosino[4,5-m][10,2,16]=benzoxadiazacicotetraconen-56-il]-2-[(10-metilundecanol)amino]-2-desoxi- $\beta$ -D-glucopiranurónico (componente principal)



**deligoparinum naticum**  
deligoparin sodium

sodium salt of depolymerised heparin obtained by a controlled chemical process based on generation of free radicals by means of metal ions and hydrogen peroxide. The heparin starting material is obtained from porcine intestinal mucosa. The process results in oligosaccharide fragments of heparin of varying lengths. The average relative molecular mass is about 3200 Daltons, ranging from 2250 to 3850 Daltons. The degree of sulfation is approximately 2.5 sulfate residues per disaccharide unit.

délégoparine sodique

sel de sodium d'héparine de basse masse moléculaire obtenue par dépolymérisation à l'aide de radicaux libres (générés par des ions métalliques et du peroxyde d'hydrogène) d'héparine de muqueuse intestinale de porc. La majorité des composants présentent une structure acide 2-O-sulfo- $\alpha$ -D-glucopyranosuronique à l'extrémité non réductrice et une structure 2-désoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-D-glucopyranose à l'extrémité réductrice de leur chaîne ; la masse moléculaire relative moyenne est voisine de 3200 (2250 à 3850) ; le degré de sulfatation est voisin de 2,5 par unité disaccharide.

deligoparina sódica

sal sódica de una heparina de baja masa molecular que se obtiene de la heparina de la mucosa intestinal porcina por despolimerización por radicales libres, generados por iones metálicos y peróxido de hidrógeno; la mayoría de los componentes tienen una estructura de ácido 2- O -sulfo- $\alpha$ -D-glucopiranosurónico en el extremo no-reductor de la cadena y una estructura 2-desoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-D-glucopiranosa en el reductor; la masa molecular media oscila entre 2250 y 3850, con un valor característico de unos 3200; el grado de sulfatación es alrededor de 2,5 por unidad de disacárido.

**desvenlafaxinum**  
desvenlafaxine


4-[(1RS)-2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol

dèsvenlafaxine

4-[(1RS)-2-(diméthylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)éthyl]phénol

desvenlafaxina

4-[(1RS)-2-(dimetilamino)-1-(1-hidroxiciclohexil)etyl]fenol

C<sub>16</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>2</sub>**diboterminum alfa**  
dibotermin alfa

human recombinant bone morphogenic protein-2 (rhBMP-2)

dibotermine alfa

protéine-2 humaine recombinante morphogénique de l'os (PMOrh-2)

dibotermina alfa

proteína-2 humana recombinante morfogénica de hueso (PMOrh-2)



QAKHKQRKRL KSSCKRHPLY VDFSDVGWND WIVAPPGYHA  
 FYCHGECFPF LADHLNSTNH AIVQTLVNSV NSKIPKACCV  
 PTELSAISML YLDENEKVVL KNYQDMVVEG CGCR

**diquafosolum**



diquafosol

 $P^1, P^4$ -bis(5'-uridyl) tetrahydrogen tetraphosphate

diquafosol

uridine(5')tétraphospho(5')uridine

dicuafosol

tetrahidrógenotetrafosfato de  $P^1, P^4$ -bis(5'-uridilo)**disermolidum**

disermolide



(3Z,5S,6S,7S,8R,9S,11Z,13S,14S,15S,16Z,18S)-8,14,18-trihydroxy-19-[(2S,3R,4S,5R)-4-hydroxy-3,5-dimethyl-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]-5,7,9,11,13,15-hexamethylnonadeca-1,3,11,16-tetraen-6-yl carbamate

disermolide

carbamate de (1S,2S,3R,4S,6Z,8S,9S,10S,11Z,13S)-3,9,13-trihydroxy-14-[(2S,3R,4S,5R)-4-hydroxy-3,5-diméthyl-6-oxotétrahydro-2H-piran-2-yl]-2,4,6,8,10-pentaméthyl-1-[(1S,2Z)-1-méthylpenta-2,4-diényl]tétradéca-6,11-diényle

disermolida

carbamato de (3Z,5S,6S,7S,8R,9S,11Z,13S,14S,15S,16Z,18S)-8,14,18-trihidroxi-19-[(2S,3R,4S,5R)-4-hidroxi-3,5-dimetil-6-oxotetrahdro-2H-piran-2-il]-5,7,9,11,13,15-hexametilnonadeca-1,3,11,16-tetraen-6-ilo





**edotecarinum**

edotecarin



12- $\beta$ -D-glucopyranosyl-2,10-dihydroxy-6-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]amino]-12,13-dihydro-6H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7-dione

édotécarine

12- $\beta$ -D-glucopyranosyl-2,10-dihydroxy-6-[[2-hydroxy-1-(hydroxyméthyl)éthyl]amino]-12,13-dihydro-6H-indolo[2,3-a]pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7-dione

edotecarina

12- $\beta$ -D-glucopiranosil-2,10-dihidroxi-6-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil]amino]-12,13-dihidro-6H-indolo[2,3-a]pirrolo-[3,4-c]carbazol-5,7-diona

**edratidum**

edratide

glycyl-L-tyrosyl-L-tyrosyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tryptophyl-L-isoleucyl-L-arginyL-L-glutaminyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysylglycyl-L-glutamyl-L-glutamyl-L-tryptophyl-L-isoleucylglycine

édratide

glycyl-L-tyrosyl-L-tyrosyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-tryptophyl-L-isoleucyl-L-arginyL-L-glutaminyl-L-prolyl-L-prolylglycyl-L-lysylglycyl-L-glutamyl-L-glutamyl-L-tryptophyl-L-isoleucylglycine

edratida

glicil-L-tirosil-L-tirosil-L-triptofil-L-seril-L-triptofil-L-isoleucil-L-arginil-L-glutaminil-L-prolin-L-prolinilglicil-L-lisilglicil-L-glutamil-L-glutamil-L-triptofil-L-isoleucilglicina



H-Gly-Tyr-Tyr-Trp-Ser-Trp-Ile-Arg-Gln-Pro-

10

Pro-Gly-Lys-Gly-Glu-Glu-Trp-Ile-Gly-OH

19

**elsilimomabum**  
elsilimomab

immunoglobulin G1, anti-(human interleukin 6) (mouse monoclonal B-E8 heavy chain), disulfide with mouse monoclonal B-E8 κ-chain, dimer

## elsilimomab

immunoglobuline G1, anti-(interleukine 6 humaine) ; dimère du disulfure entre la chaîne lourde et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal de souris B-E8

## elsilimomab

imunoglobulina G1, anti-(interleuquina 6 humana) ; dímero del disulfuro entre la cadena pesada y la cadena κ del anticuerpo monoclonal de ratón B-E8

**elvucitabinum**

## elvucitabine

4-amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-5-(hydroxymethyl)-2,5-dihydro-2-furyl]pyrimidin-2(1H)-one


## elvucitabine

4-amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-5-(hydroxyméthyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]pyrimidin-2(1H)-one

## elvucitabina

4-amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-5-(hidroximetil)-2,5-dihidro-2-furil]pirimidin-2(1H)-ona

C<sub>9</sub>H<sub>10</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>3</sub>

**epitumomabum cituxetanum**  
epitumomab cituxetan


Conjugate of 4-[(2RS)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-[(2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl)(carboxymethyl)amino]propyl]phenyl isothiocyanate forming a thiourea with the 6-amino of a lysine of immunoglobulin G1, anti-(human episialin) (mouse monoclonal HMFG-1 γ1-chain), disulfide with mouse monoclonal HMFG-1 light chain, dimer

## épitumomab cituxétan

dérivé de la thiourée produite par réaction de l'isothiocyanate de 4-[(2RS)-2-[bis(carboxyméthyl)amino]-3-[[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl](carboxyméthyl)amino]propyl]phényle avec le 6-amino d'une lysine de l'immunoglobuline G1, anti-(human episialin) ; dimère du disulfure entre la chaîne γ1 et la chaîne légère de l'anticorps monoclonal de souris HMFG-1

## epitumomab cituxetán

derivado de la tiourea producido por reacción del isotiocianato de 4-[(2RS)-2-[bis(carboximetil)amino]-3-[[2-[bis(carboximetil)amino]etil](carboximetil)amino]propil]fenil con el 6-amino de una lisina de la inmunoglobulina G1, anti-(episialina humana) ; dímero del disulfuro entre la cadena γ1 y la cadena ligera del anticuerpo monoclonal de ratón HMFG-1

**eptoterminum alfa**

eptotermin alfa


human recombinant bone morphogenetic protein 7 (hrBMP-7) or osteogenic protein-1 (OP-1)

## eptotermine alfa

protéine-7 humaine recombinante morphogénique de l'os (PMOrh-7) ou protéine-1 osteogénique (PO-1)

## eptotermina alfa

proteína-7 humana recombinante morfogénicas de hueso (PMOrh-7) o proteína-1 osteogénica (PO-1)

[C<sub>683</sub>H<sub>1061</sub>N<sub>197</sub>O<sub>208</sub>S<sub>10</sub>]<sub>2</sub>**exatecanum alideximerum**

exatecan alideximer


exatecan linked via the tetrapeptide (glycylglycyl-L-phenylalanylglycyl) to poly[oxy(2-hydroxymethylethylene)oxygenhydroxymethylmethylen] partly O-substituted with carboxymethyl groups with some carboxy groups amide linked to the tetrapeptide.

## exatécan alideximer

exatécan lié par une chaîne tétrapeptidique (glycylglycyl-L-phenylalanylglycyl) à des éthers carboxyméthyliques de poly[oxy(2-hydroxyéthylène)oxy[1-(hydroxyméthyl)éthylène]]

## exatecán alidexímero

exatecán ligado por una cadena tetrapeptídica (glicilglicil-L-fenilalanilglicil) a éteres carboximetílicos de polí[oxy(2-hidroxietilideno)oxi[1-(hidroximetil)etileno]]



**exenatidum**  
exenatide

L-histidylglycyl-L-glutamylglycyl-L-threonyl-L-phenylalanyl-L-threonyl-L-seryl-L-aspartyl-L-leucyl-L-seryl-L-lysyl-L-glutaminyl-L-methionyl-L-glutamyl-L-glutamyl-L-glutamyl-L-alanyl-L-valyl-L-arginyl-L-leucyl-L-phenylalanyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-tryptophyl-L-leucyl-L-lysyl-L-asparaginylglycylglycyl-L-prolyl-L-seryl-L-serylglycyl-L-alanyl-L-prolyl-L-prolyl-L-prolyl-L-serinamide

## exénatide

exendine 4 (*Heloderma suspectum*), synthétique

## exenatida

L-histidilglicil-L-glutamilglicil-L-treonil-L-fenilalanil-L-treonil-L-seril-L-aspartil-L-leucil-L-seril-L-lisil-L-glutaminil-L-metionil-L-glutamil-L-glutamyl-L-glutamyl-L-alanil-L-valil-L-arginil-L-leucil-L-fenilalanil-L-isoleucil-L-glutamyl-L-triptofil-L-leucil-L-lisil-L-asparaginlglicilglicil-L-prolil-L-serilglicil-L-alanil-L-prolil-L-prolil-L-prolil-L-serinamida

C<sub>184</sub>H<sub>282</sub>N<sub>50</sub>O<sub>60</sub>S

H-His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-  
 10  
 Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-  
 20  
 Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH<sub>2</sub>  
 30  
 39

**firocoxibum**  
firocoxib

3-(cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)=phenyl]furan-2(5H)-one


## firocoxib

3-(cyclopropylméthoxy)-5,5-diméthyl-4-[4-(méthylsulfonyl)=phényl]furan-2(5H)-one

## firocoxib

3-(ciclopropilmetoxi)-5,5-dimetil-4-[4-(metilsulfonil)fenil]furan-2(5H)-ona

C<sub>17</sub>H<sub>20</sub>O<sub>5</sub>S



**fispemifenum**  
fispemifene



2-(2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphenylbut-1-enyl]phenoxy}=ethoxy)ethanol

## fispémifène

2-[2-{4-[(1Z)-4-chloro-1,2-diphénylbut-1-ényl]phénoxy}=éthoxy]éthanol

## fispemifeno

2-(2-{4-[(1Z)-4-cloro-1,2-difenilbut-1-enil]fenoxi}etoxi)etanol



**fluoresceinum lisicolum**  
fluorescein lisicol


*N*<sup>6</sup>-{(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthen]-5-yl)thiocarbamoyl}-*N*<sup>2</sup>-(3*α*,7*α*,12*α*-trihydroxy-5*β*-cholan-24-oyl)-L-lysine

fluorescéine lisicol

acide (2*S*)-6-[[{(3',6'-dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3*H*),9'-xanthén]-5-yl)thiocarbamoyl]amino}-2-[(3*α*,7*α*,12*α*-trihydroxy-5*β*-cholan-24-oyl)amino]pentanoïque

fluoresceina lisicol

ácido 5-[({{(5*S*)-5-carboxi-5-[(3*α*,7*α*,12*α*-trihidroxi-5*β*-colan-24-oil)amino]pentil}thiocarbamoil)amino]-2-(6-hidroxi-3-oxo-3*H*-xanten-9-il)benzoico



**freselestatum**  
freselestat



2-[5-amino-6-oxo-2-phenylpyrimidin-1(6*H*)-yl]-*N*-[(1*RS*)-1-(5-*tert*-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]acetamide

frésélestat

2-(5-amino-6-oxo-2-phénylpyrimidin-1(6*H*)-yl)-*N*-[(1*RS*)-1-[(5-(1,1-diméthyléthyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]-2-méthylpropyl]acétamide

freselestat

2-[5-amino-6-oxo-2-fenilpirimidin-1(6*H*)-il]-*N*-[(1*RS*)-1-(5-*terc*-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il]acetamida



**galiximabum**  
galiximab

immunoglobulin G1, anti-(human CD80 (antigen)) (human-*Macaca irus* monoclonal IDEC-114 heavy chain), disulfide with human-*Macaca irus* monoclonal IDEC-114  $\lambda$  chain, dimer

galiximab

immunoglobuline G1, anti-(antigène CD80 humain), dimère du disulfure entre la chaîne  $\lambda$  et la chaîne lourde de l'anticorps monoclonal chimérique homme-macaque (*Macaca irus*) IDEC-114

galiximab

inmunoglobulina G1, anti-(antígeno CD80 humano), dímero del disulfuro entre la cadena  $\lambda$  y la cadena pesada del anticuerpo monoclonal químérico hombre-macaco (*Macaca irus*) IDEC-114

**hemoglobinum raffimerum**  
hemoglobin raffimer


The polyaldehyde [(2*R*,4*S*,6*R*,8*R*,11*S*,13*R*)-1,14-dihydroxy-4-hydroxymethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatetradecane-2,4,6,8,11,13-hexacarbaldehyde] derived from raffinose [ $\beta$ -D-fructofuranosyl  $\alpha$ -D-galactopyranosyl(1 $\rightarrow$ 6)- $\alpha$ -D-glucopyranoside] by treatment with sodium periodate is reacted with human hemoglobin A<sub>0</sub> at the 2,3-DPG binding pocket. Both intermolecular and intramolecular crosslinking occurs. This product is reduced to generate covalent amine bonds with >95% crosslinked hemoglobin of which about 55% is polymerised.

hémoglobine raffimer

hémoglobine stabilisée et partiellement polymérisée, obtenue par réduction du produit de la réaction du (2*R*,4*S*,6*R*,8*R*,11*S*,13*R*)-1,14-dihydroxy-4-(hydroxyméthyl)-3,5,7,10,12-pentaoxatétradécane-2,4,6,8,11,13-hexacarbaldéhyde (obtenu par oxydation périodique du rafinose) avec l'hémoglobine humaine

hemoglobina rafímero

hemoglobina estabilizada y parcialmente polimerizada, obtenida por reducción del producto de la reacción del (2*R*,4*S*,6*R*,8*R*,11*S*,13*R*)-1,14-dihidroxi-4-(hidroximetil)-3,5,7,10,12-pentaoxatetradecano-2,4,6,8,11,13-hexacarbaldehído (obtenido por oxidación periódica de la rafinosa) con la hemoglobina humana



**icofungipenum**



icofungipen

(1*R*,2*S*)-2-amino-4-methylenecyclopentane-1-carboxylic acid

icofungipen

(-)-acide (1*R*,2*S*)-2-amino-4-méthylène cyclopentanecarboxylique

icofungipeno

(-)-ácido (1*R*,2*S*)-2-amino-4-metilenociclopentanocarboxílico**icrocaptidum**



icroaptide

glycyl-*N*<sup>2</sup>-ethyl-L-lysyl-L-prolyl-L-arginine

icroaptide

glycyl-(*N*<sup>2</sup>-éthyl-L-lysyl)-L-prolyl-L-arginine

icroaptida

glicil-(*N*<sup>2</sup>-etyl-L-lisil)-L-prolil-L-arginina**iferanserimum**



iferanserin

(E)-2-[2-[(2*S*)-1-methyl-2-piperidyl]ethyl]cinnamanilide

iféransérine

(-)-(2*E*)-*N*-[2-[2-[(2*S*)-1-méthylpipéridin-2-yl]éthyl]phényl]-3-phénylprop-2-énamide

iferanserina


(-)-(2*E*)-*N*-(2-{2-[(2*S*)-1-metilpiperidin-2-il]etyl}fenil)-3-fenilprop-2-enamida

**istradefyllinum**  
istradefylline8-[(*E*)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl]-1,3-diethyl-7-methyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dione

## istradéfylline

8-[(*E*)-2-(3,4-diméthoxyphényl)éthényle]-1,3-diéthyl-7-méthyl-3,7-dihydro-1*H*-purin-2,6-dione


## istradefilina

8-[(*E*)-2-(3,4-dimetoxifenil)vinil]-1,3-dietil-7-metil-3,7-dihidro-1*H*-purin-2,6-dionaC<sub>20</sub>H<sub>24</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub>**ixabepilonum**  
ixabepilone(1S,3S,7S,10R,11S,12S,16*R*)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[(1*E*)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-17-oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione

## ixabépilone

(1S,3S,7S,10R,11S,12S,16*R*)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentaméthyl-3-[(1*E*)-1-méthyl-2-(2-méthylthiazol-4-yl)éthényle]-17-oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadécane-5,9-dione


## ixabepilona

(1S,3S,7S,10R,11S,12S,16*R*)-7,11-dihidroxio-8,8,10,12,16-pentametil-3-[(1*E*)-1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)prop-1-en-2-il]-17-oxa-4-azabiciclo[14.1.0]heptadecano-5,9-dionaC<sub>27</sub>H<sub>42</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>S**ladostigilum**  
ladostigil(3*R*)-3-(prop-2-ynylamino)indan-5-yl ethyl(methyl)carbamate

## ladostigil

éthylméthylcarbamate de (3*R*)-3-(prop-2-ynylamino)-2,3-dihydro-1*H*-indén-5-yle

## ladostigilo

etilmetylcarbamato de (3*R*)-3-(prop-2-inilamino)indan-5-iloC<sub>16</sub>H<sub>20</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

**lapatinibum**


lapatinib

*N*-[3-chloro-4-(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-[5-([2-(methylsulfonyl)=ethyl]amino)methyl]-2-furyl]quinazolin-4-amine

lapatinib

*N*-[3-chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]phenyl]-6-[5-[[2-(methylsulfonyl)ethyl]amino]methyl]-2-furyl]quinazolin-4-amine

lapatinib

*N*-[3-chloro-4-(3-fluorobenciloxy)fenil]-6-[5-([2-(metilsulfonil)=etil]amino)metil]-2-furil]quinazolin-4-aminaC<sub>29</sub>H<sub>26</sub>ClFN<sub>4</sub>O<sub>4</sub>S**lomeguatribum**


lomeguatrib

6-(4-bromophenoxy)-7*H*-purin-2-amine

lomeguatrib

6-[(4-bromothiophen-2-yl)methoxy]-7*H*-purin-2-amine

lomeguatrib

6-(4-bromotenilloxi)-7*H*-purin-2-aminaC<sub>10</sub>H<sub>8</sub>BrN<sub>6</sub>OS**odiparcilum**


odiparcil

4-methyl-7-(5-thio-β-D-xylopyranosyloxy)-2*H*-chromen-2-one

odiparcil

4-méthyl-7-[(5-thio-β-D-xylopyranosyl)oxy]-2*H*-1-benzopyran-2-one

odiparcilo

4-metil-7-(5-tio-β-D-xilopiranosiloxi)-2*H*-cromen-2-onaC<sub>15</sub>H<sub>16</sub>O<sub>6</sub>S

**omigananum**  
omiganan

L-isoleucyl-L-leucyl-L-arginyL-tryptophyl-L-prolyL-tryptophyl-L-tryptophyl-L-prolyL-tryptophyl-L-arginyl-L-arginyL-lysinamide

omiganan

L-isoleucyl-L-leucyl-L-arginyL-tryptophyl-L-prolyL-tryptophyl-L-tryptophyl-L-prolyL-tryptophyl-L-arginyl-L-arginyL-lysinamide

omiganán

L-isoleucil-L-leucil-L-arginil-L-triptofil-L-prolil-L-triptofil-L-arginil-L-arginil-L-lisinamida

 $C_{90}H_{127}N_{27}O_{12}$ 

H-Ile—Leu—Arg—Trp—Pro—Trp—Pro—Trp—Arg—Arg—Lys—NH<sub>2</sub>  
10

**pactimibum**  
pactimibe


[7-(2,2-dimethylpropanamido)-4,6-dimethyl-1-octylindolin-5-yl]acetic acid

pactimibe

acide [7-[(2,2-diméthylpropanoyl)amino]-4,6-diméthyl-1-octyl-2,3-dihydro-1*H*-indol-5-yl]acétique

pactimiba

ácido [7-(2,2-dimetilpropanamido)-4,6-dimetil-1-octilindolin-5-il]acético

 $C_{25}H_{40}N_2O_3$ **patupilonum**  
patupilone


(1*S*,3*S*,7*S*,10*R*,11*S*,12*S*,16*R*)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentamethyl-3-[(1*E*)-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)prop-1-en-2-yl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione

patupilone

(1*S*,3*S*,7*S*,10*R*,11*S*,12*S*,16*R*)-7,11-dihydroxy-8,8,10,12,16-pentaméthyl-3-[(1*E*)-1-méthyl-2-(2-méthylthiazol-4-yl)éthényle]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadécane-5,9-dione

patupilona

(1*S*,3*S*,7*S*,10*R*,11*S*,12*S*,16*R*)-7,11-dihidroxi-8,8,10,12,16-pentametil-3-[(1*E*)-1-(2-metil-1,3-tiazol-4-il)prop-1-en-2-il]-4,17-dioxabicielo[14.1.0]heptadecano-5,9-diona

 $C_{27}H_{41}NO_6S$ 

**pertuzumabum**

pertuzumab

immunoglobulin G1, anti-(human v (receptor)) (human-mouse monoclonal 2C4 heavy chain), disulfide with human-mouse monoclonal 2C4 κ-chain, dimer

pertuzumab

immunoglobuline G1, anti-(récepteur v humain), dimère du disulfure entre la chaîne κ et la chaîne lourde de l'anticorps monoclonal de souris humanisé 2C4

pertuzumab

inmunoglobulina G1, anti-(receptor v humano), dímero del disulfuro entre la cadena κ y la cadena pesada del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón 2C4

**pixantronum**

pixantrone

6,9-bis[(2-aminoethyl)amino]benzo[g]isoquinoline-5,10-dione


pixantrone

6,9-bis[(2-aminoéthyl)amino]benzo[g]isoquinoléine-5,10-dione

pixantrona

6,9-bis[(2-aminoetil)amino]benzo[g]isoquinolina-5,10-diona

$C_{17}H_{19}N_5O_2$

**pritumumabum**

pritumumab

immunoglobulin G, anti-(human vimentin) (human monoclonal CLN G11 γ1-chain), disulfide with human monoclonal CLN G11 κ-chain, dimer

pritumumab

immunoglobuline G, anti-(vimentine humaine) ; dimère du disulfure entre la chaîne γ1 et la chaîne κ de l'anticorps monoclonal humain CLN H11

pritumumab

inmunoglobulina G, anti-(vimentina humana); dímero del disulfuro entre la cadena γ1 y la cadena κ del anticuerpo monoclonal humano CLN H11

$C_{6440}H_{9968}N_{1708}O_{2016}S_{42}$

**ralfinamidum**

ralfinamide



(2S)-2-[4-(2-fluorobenzyl)oxy]benzylamino]propanamide

ralfinamide

(+)-(2S)-2-[[4-[(2-fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide

ralfinamida

(+)-(2S)-2-[4-(2-fluorobenciloxy)bencilamino]propanamide

**rebimastatum**

rebimastat


*N*-[(2*S*)-2-sulfanyl-4-(3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)butanoyl]-L-leucyl-N',3-dimethyl-L-valinamide

rébimastat

(2*S*)-*N*-[(1*S*)-2,2-diméthyl-1-(méthylcarbamoyl)propyl]-4-méthyl-2-[(2*S*)-2-sulfanyl-4-(3,4,4-triméthyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)butanoyl]amino]pentanamide

rebimastat

*N*-[(2*S*)-2-sulfanil-4-(3,4,4-triméthyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)butanoil]-L-leucil-N',3-dimétil-L-valinamida

**segesteronum**

segesterone


17-hydroxy-16-methylene-19-norpregn-4-ene-3,20-dione

ségestérone

17-hydroxy-16-méthylène-19-norprégn-4-ène-3,20-dione

segesterona

17-hidroxi-16-metíleno-19-norpregn-4-eno-3,20-diona

**semapimodum**

semapimod



*N,N'*-bis{3,5-bis[1-(carbamimidoylhydrazone)ethyl]phenyl}=decanediamide

sémapimod

*N,N'*-bis{3,5-bis[N-(carbamimidoylamino)acétimidoyl]phényl}=décanediamide

semapimod

*N,N'*-bis{3,5-bis[1-(carbamimidooilhidrazono)etyl]fenil}=decanodiamida



**sufugolixum**  
sufugolix



5-{{[benzyl(methyl)amino]methyl}-1-(2,6-difluorobenzyl)-6-[4-(3-methoxyureido)phenyl]-3-phenylthieno[2,3-*d*]pyrimidine-2,4(1*H*,3*H*)-dione

sufugolix

1-[4-[(benzylméthylamino)méthyl]-1-(2,6-difluorobenzyl)-2,4-dioxo-3-phényl-1,2,3,4-tétrahydrothiéno[2,3-*d*]pyrimidin-6-yl]phényl]-3-méthoxyurée

sufugolix

5-{{[bencil(metil)amino]metil}-1-(2,6-difluorobencil)-6-[4-(3-metoxiureido)fenil]-3-feniltieno[2,3-*d*]pirimidina-2,4(1*H*,3*H*)-diona



**tacapenemum**  
tacapenem


(+)-(4*R*,5*S*,6*S*)-6-[(1*R*)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(3*R*)-5-oxopyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid

tacapénem

(+)-acide (4*R*,5*S*,6*S*)-6-[(1*R*)-1-hydroxyéthyl]-4-méthyl-7-oxo-3-[(3*R*)-5-oxopyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ène-2-carboxylique

tacapenem

(+)-ácido (4*R*,5*S*,6*S*)-6-[(1*R*)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-3-[(3*R*)-5-oxopirrolidin-3-il]sulfanil]-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxílico



**tafluprostanum**  
tafluprost



isopropyl (5*Z*)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-2-[(1*E*)-3,3-difluoro-4-phenoxybut-1-enyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-enoate

## tafluprost

(5*Z*)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-2-[(1*E*)-3,3-difluoro-4-phénoxycyclopentyl]hept-5-énoate de 1-méthyléthyle

## tafluprost

(5*Z*)-7-[(1*R*,2*R*,3*R*,5*S*)-2-[(1*E*)-3,3-difluoro-4-fenoxibut-1-enil]-3,5-dihidroxiciclopentil]hept-5-enoato de isopropilo



**talizumabum**  
talizumab

immunoglobulin G, anti-(human immunoglobulin E Fc region) (human-mouse monoclonal Hu901  $\gamma$ -chain), disulfide with human-mouse monoclonal Hu901  $\kappa$ -chain, dimer

## talizumab

immunoglobuline G, anti-(région Fc de l'immunoglobuline E humaine), dimère du disulfure entre la chaîne  $\kappa$  et la chaîne  $\gamma$  de l'anticorps monoclonal de souris humanisé Hu901

## talizumab

inmunoglobulina G, anti-(región Fc de la inmunoglobulina E humana), dímero del disulfuro entre la cadena  $\kappa$  y la cadena  $\gamma$  del anticuerpo monoclonal humanizado de ratón Hu901

**technetium (99mTc) nitridocadum**

technetium (99mTc) nitridocade



(SPY-5-21)-bis[ethoxy(ethyl)dithiocarbamato- $\kappa$ S, $\kappa$ S]nitrido-[<sup>99m</sup>Tc]technetium

technétium (99mTc) nitridocade

(SPY-5-21)-bis(éthoxyéthyldithiocarbamato- $\kappa$ S, $\kappa$ S)nitrido-[<sup>99m</sup>Tc]technétium

tecncio (99mTc) nitridocado

(SPY-5-21)-bis(etoxietilditiocarbamato- $\kappa$ S, $\kappa$ S)nitrido-[<sup>99m</sup>Tc]tecncio

**tesofensinum**



tesofensine

(1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3,4-dichlorophenyl)-2-(ethoxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane

## tésofensine

(1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3,4-dichlorophényle)-2-(éthoxyméthyl)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane

## tesofensina

(1*R*,2*R*,3*S*,5*S*)-3-(3,4-diclorofenil)-2-(etoximetil)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano**tifenazoxidum**


tifenazoxide

6-chloro-*N*-(1-methylcyclopropyl)-1,1-dioxo-1,4-dihydro-1*λ*<sup>6</sup>-thieno[3,2-e][1,2,4]thiadiazin-3-amine

## tifénazoxide

1,1-dioxyde de 6-chloro-*N*-(1-méthylcyclopropyl)-4*H*-thiéno[3,2-e]-1,2,4-thiadiazin-3-amine

## tifenazóxido

1,1-dióxido de 6-cloro-*N*-(1-metilciclopropil)-4*H*-tieno[3,2-e]-1,2,4-thiadiazin-3-amina**tisocalcitatum**

tisocalcitate


isopropyl (1*S*,3*R*,5*Z*,7*E*,22*E*,24*R*)-1,3,24-trihydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19),22-tetraene-25-carboxylate

## tisocalcitate

(5*Z*,7*E*,22*E*,24*R*)-1*α*,3*β*,24-trihydroxy-9,10-sécocholest-5,7,10(19),22-tétraène-25-carboxylate de 1-méthyléthyle

## tisocalcitato

(1*S*,3*R*,5*Z*,7*E*22*E*,24*R*)-1,3,24-trihidroxi-9,10-secocoleta-5,7,10(19),22-tetraeno-25-carboxilato de isopropilo



**ulifloxacinum**  
ulifloxacin


(1*RS*)-6-fluoro-1-methyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-  
*4H*-[1,3]thiazeto[3,2-*a*]quinoline-3-carboxylic acid

ulifloxacin

acide (1*RS*)-6-fluoro-1-méthyl-4-oxo-7-(pipérazin-1-yl)-  
*4H*-[1,3]thiazéto[3,2-*a*]quinoléine-3-carboxylique

ulifloxacino

ácido (1*RS*)-6-fluoro-1-metil-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-  
*4H*-[1,3]tiazeto[3,2-*a*]quinolina-3-carboxílico



**vareniclinum**  
varenicline


7,8,9,10-tetrahydro-6*H*-6,10-methanoazepino[4,5-*g*]quinoxaline

varénicline

(6*R*,10*S*)-7,8,9,10-tétrahydro-6,10-méthano-6*H*-pyrazino[2,3-*h*][3]benzazépine

vareniclina

7,8,9,10-tetrahidro-6*H*-6,10-metanoazepino[4,5-*g*]quinoxalina



**AMENDMENTS TO PREVIOUS LISTS  
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LISTES ANTÉRIEURES  
MODIFICACIONES A LAS LISTAS ANTERIORES**

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 04  
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 04  
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 04  
(Crónica de la OMS, Vol. 16, N° 4, Abril de 1962)**

p. 158	<i>suprimase</i> metodilazina	<i>insértese</i> metdilazina
--------	----------------------------------	---------------------------------

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 06  
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 06  
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 06  
(WHO Chronicle, Vol. 20, No. 11, 1967)  
(Chronique OMS, Vol. 20, N° 11, 1967)  
(Crónica de la OMS, Vol. 21, N° 11, 1967)**

<b>lauromacrogol 400</b>		
p. 427	lauromacrogol 400	<i>replace the description by the following:</i> polyethylene glycol monododecyl ether, the name is followed by a number (400) corresponding approximately to the average molecular mass of the polyethylene glycol portion
p. 474	lauromacrogol 400	<i>remplacer la description par la suivante:</i> $\alpha$ -dodécyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyéthylène), la masse moyenne de la partie macrogol (# 44n+18) est indiquée entre parenthèses après la dénomination
p. 340	lauromacrogol 400	<i>sustitúyase la descripción por la siguiente:</i> éter monododecílico del polietilen glicol, al nombre le sigue un número (400) que corresponde aproximadamente a la masa molecular media de la fracción polietilenglicol

**Recommended International Nonproprietary Names (Rec. INN): List 40  
Dénominations communes internationales recommandées (DCI Rec.): Liste 40  
Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas (DCI Rec.): Lista 40  
(WHO Drug Information, Vol. 12, No. 3, 1998)**

p. 194	<i>supprimer</i> pregabaline	<i>insérer</i> prégalabine
--------	---------------------------------	-------------------------------

**Procedure and Guiding Principles / Procédure et Directives / Procedimientos y principios generales**

The text of the *Procedures for the Selection of Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* and *General Principles for Guidance in Devising International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances* will be reproduced in uneven numbers of proposed INN lists only.

Les textes de la *Procédure à suivre en vue du choix de dénominations communes internationales recommandées pour les substances pharmaceutiques* et des *Directives générales pour la formation de dénominations communes internationales applicables aux substances pharmaceutiques* seront publiés seulement dans les numéros impairs des listes des DCIs proposées.

El texto de los Procedimientos de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las sustancias farmacéuticas y de los Principios generales de orientación para formar denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas aparece solamente en los números impares de las listas de DCI propuestas.